ARAŞTIRMA MAKALESİ

RESEARCH ARTICLE

Çamaltı Tuzlasının (Sasalı/İzmir) alg florası ve mevsimsel değişimleri

The seasonal changes and algal flora of Çamaltı Saltworks (Sasalı / İzmir)

Edis Kuru^{1*} • Mustafa Deniz²

¹ Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 35100, Bornova, İzmir

² İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Çiğli, İzmir

* Corresponding author: edis.kuru@ege.edu.tr

Received date: 20.07.2017

Accepted date: 30.10.2017

How to cite this paper:

Kuru, E. & Deniz, M. (2017). The seasonal changes and algal flora of Çamaltı Saltworks (Sasalı / İzmir). *Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 34(4):431-442. doi: [10.12714/egejfas.2017.34.4.10](https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.4.10)

Öz: Bu araştırma İzmir Çamaltı tuzlası ekosisteminde dağılım gösteren alglerin belirlenmesi amacıyla 2015 yılında, 8 istasyonda mevsimsel ve aylık örneklemeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda; Çamaltı tuzlası deniz alglerinden Cyanophyceae sınıfına ait 4, Chlorophyceae sınıfına ait 7, Bacillariophyceae 11 takson, Phaeophyceae sınıfına ait 3 takson, Rhodophyceae sınıfına ait 3 takson ve Monocots sınıfına ait 1 takson olmak üzere toplam 29 takson belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Ege denizi, Çamaltı tuzlası, alg, Dunaliella, İzmir, Türkiye

Abstract: This research was carried out in 2015 with the aim of determining the algae distributed in İzmir Çamaltı saltworks ecosystem by making seasonal and monthly sampling in 8 stations. At the end of study; in total, 29 taxa including; 4 taxa belonging to Cyanophyceae class, 7 taxa including to Chlorophyceae class, 11 belonging to Bacillariophyceae class, 3 belonging to Phaeophyceae class, 3 taxa including to Rhodophyceae class and 1 taxa including to Monocots classis were determined.

Keywords: Aegean sea, Çamaltı Saltworks, Algae, Dunaliella, İzmir, Turkey

GİRİŞ

Sulak alanlar, yeryüzünün biyolojik, endüstriyel, sosyolojik olarak verimli ve en üretken ekosistemlerini oluşturmaktadır. Bu alanlar, yöre insanlarına ve ülkenin geneline geniş yelpazede (ekonomik, sosyolojik, kültürel, turizm vb.) hizmet veren oldukça karmaşık doğal sistemlerdir ve yeryüzündeki başka hiçbir ekosistemle karşılaştırılmayacak ölçüde işlev ve değerlere sahiptir. Türkiye'nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi'nde sulak alanların tanımı; "Doğal ya da yapay, sürekli ya da mevsimsel, tatlı, acı ya da tuzlu, durgun ya da akan su kütleleri, nehir ve göller, bataklıklar, turbalıklar ve gelgitin çekilmiş anında derinliği altı metreyi aşmayan deniz suları" olarak tanımlanmaktadır (Pritchard, 2010). Sulak alan kapsamında değerlendirilen yüksek tuzlulukta ki kıyusal deniz tuzlaları, birincil üretim ve ekolojik özellikleri bakımından tüm Dünyada ve Akdeniz havzasındaki önemli biyolojik kaynaklardan bazılarıdır (Korovessis ve Lekkas, 2000; UNEP, 2013). Deniz kaynaklı Tuzlalar aynı zamanda mineral maden, su ürünleri, ekoturizm, rüzgâr ve güneş enerjisi, biyomas ve biyoteknolojik bakımından son derece önemli ekonomik potansiyele sahip ekosistemlerdir (Cheng, 1991; Borowitzka, 1997). Sulak alan özelliklerine sahip olan ve Gediz Deltası sınırları içerisinde bulunan İzmir Çamaltı Tuzlası, Gediz

Deltası'nın yaklaşık 20.400 km²'lik kısmının 1998 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ramsar Sözleşmesi Listesi'ne dahil edilmesiyle "Uluslararası Öne Sahip Sulak Alan" kapsamına alınmıştır. Ramsar statüsü dışında da bölgenin 1981 yılından beri 'Sit Alanı' statüsü bulunmaktadır. Oluşturulan "Sulak Alan Yönetim Planı" 2007 yılında tamamlanarak uygulamaya başlanmıştır. Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki İzmir Çamaltı Tuzlası işletmesi 32.382.000 m² alandaki çeşitli hacimdeki buharlaştırma havuzları ve 3.148.491 m² alana yaygın 77-78 adet kristalizasyon havuzu ile İzmir Kuş Cennetiyle birlikte, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin tuz ihtiyacının %35-40'ını karşılayan, 2 adet deniz kaynaklı tuz üretim alanından, en büyük tek tuzlasıdır. Coğrafi olarak 38° 30 dk. 18 sn. Kuzey, 26° 54 dk. 55 sn. Doğu koordinatlarında, İzmir ili Sasalı beldesi, Çiğli ilçesindedir (Şekil 1).

Bu çalışmada, İzmir Çamaltı tuzlası ekosistemi kıyı littoral bölgeyle, tuz üretim parsellerindeki biyolojik (algler), fiziksel, kimyasal ve su kalite özelliklerinin belirlenmesi ve daha sonra yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere bir veri tabanı oluşturması amaçlanmıştır.

Şekil 1. Çamaltı tuzlası (Sasalı-İzmir). (Google Earth, www.google.com/intl/tr/earth/)

Figure 1. Çamaltı saltworks (Sasalı-İzmir). (Google Earth, www.google.com/intl/tr/earth/)

MATERYAL VE METOT

Çalışma alanı

Çalışma, 2015 yılında, İzmir Çamaltı tuzlası ekosisteminde 8 istasyonda mevsimsel ve aylık örneklemelerle yürütülmüştür (Şekil 2).

Şekil 2. İzmir Çamaltı Tuzlası ve örnekleme yapılan istasyonlar (Google Earth, <https://www.google.com/intl/tr/earth/>)

Figure 2. İzmir Çamaltı Saltworks and sampling stations (Google Earth, <https://www.google.com/intl/tr/earth/>)

Fitoplankton Örnekleme ve Teşhisi

Ekosistemindeki fitoplankton tür çeşitliliğini ve yoğunluğunu belirlemek için her bir örnekleme havuzundan kıyı ve merkez olmak üzere iki noktadan çekim yapılarak, yüzey su filminin

altından da 1 L su örneği alınmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler I-KI (lügol) çözeltisi ilave edilerek 1 L hacme sahip cam mezürlerde 24 saat çöktürülmüş ve son hacim 100 ml'ye ayarlanarak saklanmıştır. Fitoplankton örneklerinin tür kompozisyonunu belirlemek için ise belirlenen istasyonlardan

45µm göz açıklığına sahip plankton kepçesiyle yüzeyden yatay çekim yapılarak örnek alınmıştır. Örnekler %4'lük formaldehit solüsyonu ilave edilerek tespit edilmiştir. Alg taksonlarının tayininde Bourrelly (1968, 1970); Bourrelly ve Couté (1991); Hecky ve Kilham (1973); Oren (2005); Koray vd. (2007); Ak (2008); Nagasathya ve Thajuddin (2008); Yurga (2015) gibi araştırmacıların eserlerinden yararlanılmıştır.

Taksonların güncel isimleri ve sistematik kategorileri Algaebase, WoRMS (World Register Marine Species), LPSN (List of Prokaryotic names with standing in nomenclature) ve Plankweb (Check-list of Turkish Seas Microplankton) veri tabanından kontrol edilmiştir (Yurga, 2015). Taksonların nispi bolluk dereceleri belirlenmiş ve baskın (■), yarı baskın (▲) ve mevcut (+) olarak sınıflandırılmıştır.

Fiziksel Ölçümler

Su sıcaklığı (T: °C), toplam çözünmüş oksijen(mg/L), tuzluluk (S:ppt), pH gibi analitik değerler için HI98194 model multiparametre ölçüm cihazı ve Atago Brix 32 tuzluluk reflaktometresi, in situ olarak kullanılmıştır.

Kimyasal Analizler

Örneklem istasyonlarından alınan su numunelerinin analizleri örneklemeyi izleyen ilk 24 saat içerisinde yapılmıştır. Analizlerde, Standarts Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association (APHA), metotları uygulanmıştır (APHA, 1992).

BULGULAR

Biyolojik Bulgular

Çamaltı tuzlası ekosisteminde 6 sınıfa ait 29 takson belirlenmiştir. Belirlenen taksonların 4 tanesi Cyanophyceae (%13,79), 7 tanesi Chlorophyceae (%24,13), 11 tanesi Bacillariophyceae (%37,93), 3 tanesi Phaeophyceae (%10,34), 3 tanesi Rhodophyceae (%10,34), 1 tanesi Monocots (%3,44) sınıflarına aittir. Takson listesi Tablo 2'de verilmiştir. Ekosistemde en fazla takson sayısı Bacillariophyceae ve Chlorophyceae sınıflarına aittir. Bu sınıfları sırasıyla Cyanophyceae, Rhodophyceae, Phaeophyceae ve tek tür ile Monocots takip etmektedir. Çamaltı tuzlası ekosisteminde 6 büyük alg sınıfına ait organizmaların aylık değişimi Tablo 1.'de verilmiştir.

Tablo 1. Çamaltı tuzlasında 2015 yılında tespit edilen algler ve aylara göre dağılımı (Taksonların nispi bolluk dereceleri; baskın (■), yarı baskın (▲) ve mevcut (+) olarak ifade edilmiştir)

Table 1. The algae of Çamaltı saltworks and distribution by monthly in 2015 (Proportional abundance ratings of taxa expressed as; dominant (■), semi-dominant (▲), and present (+))

Zaman (2015 Yılı)												
Aylar												
Ocak:(Ock): Şubat, (Şbt), Mart: (Mrt), Nisan: (Nsn), Mayıs: (Mys), Haziran: (Hzn), Temmuz: (Tmz), Ağustos: (Ats), Eylül: (Eyl), Ekim: (Ekm), Kasım: (Ksm), Aralık: (Ark)												
Örneklem istasyonları: ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧.												
Taksonlar	Ock	Şbt	Mrt	Nsn	Mys	Hzn	Tmz	Ats	Eyl	Ekm	Ksm	Ark
Cyanophyceae												
<i>Aphanothece halophytica</i> Frémy in Hof & Frémy 1933			②+ ③+ ④+ ⑤+	②+ ③+ ④+ ⑤+	②+ ③+ ④+ ⑤+	②+ ③+ ④+ ⑤+	②+ ③+ ④+ ⑤+			②+ ③+ ④+ ⑤+		
<i>Lyngbya majuscula</i> C. Agardh ex Gomont, 1892	①■ ②+ ③+ ④+ ⑤+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+	②+
<i>Oscillatoria</i> sp. Vaucher ex Gomont, 1822	②+ ③+		②+ ③+	③+ ④+ ⑤+	③+ ④+ ⑤+	③+	③+	③+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+		
<i>Halospirulina</i> sp. Nübel et al., 2000	③+	③+	①+									
Chlorophyceae												
<i>Dunaliella salina</i> Teodoresco, 1905	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■	②■ ③■ ④■ ⑤+ ⑥■

<i>Dunaliella viridis</i> Teodoresco, 1905	①+ ②▲ ③▲	①+ ②▲ ③▲	①+ ②▲ ③▲	①+ ②▲ ③▲	①+ ②▲ ③▲	①+	①+	①+	①+	①+ ③■	①+ ⑤+	①+ ⑤+
<i>Dunaliella</i> sp.	①+ ②■ ③■ ④■ ⑤+	①+ ②■ ③■ ④■ ⑤+	①+ ②■ ③■ ④■ ⑤+	①+ ②■ ③■ ④■ ⑤+	①+ ②■ ③■ ④■ ⑤+						⑤+	⑤+
<i>Tetraselmis indica</i> Arora et.al., 2013.				②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+	②+ ③+				
<i>Ulva rigida</i> C. Agardh 1823				⑥■ ⑦■	⑥■ ⑦■	⑥■ ⑦■	⑥■ ⑦■	⑥■ ⑦■	⑥■ ⑦■	⑥■ ⑦■		
<i>Chaetomorpha aerea</i> (Dillwyn) Kützing 1849	①■	①■	①■	①■					①■	①■	①■	①■
<i>Enteromorpha intestinalis</i> (Linnaeus) Nees, 1820	⑥+	⑥+	⑥+	⑥+	⑥+							
Bacillariophyceae												
<i>Flagilaria</i> sp. Lyngbye, 1819.	①+	①+	①+	①+						①+	①+	
<i>Navicula</i> sp. Bory de Saint-Vincent, 1822	①+ ②+	①+ ②+	①+ ②+	①+ ②+	①+ ②+	①+ ②+	①+	①+	①+	①+		
<i>Closterium navicula</i> (Brébisson) Lütkenmüller	①+ ②+	①+ ②+	①+ ②+	①+ ②+	①+ ②+	①+ ②+						
<i>Ceratoneis closterium</i> Ehrenberg 1839	①+ ④+ ⑤+							①+ ②+				
<i>Chaetoceros affinis</i> Lauder		⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+									
<i>Chaetoceros didymus</i> Ehrenberg		⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+									
<i>Gyrosigma</i> sp. Hassall	①+											
<i>Gymnodinium</i> sp.		⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+									
<i>Pleurosigma formosum</i> W. Smith 1852	①+											
<i>Skeletonema costatum</i> (Greville) Cleve		⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+									
<i>Thalassiosira</i> sp.		⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+									
Phaeophyceae												
<i>Cystosera barbata</i> (Stackhouse) C. Agardh, 1820	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+
<i>Stypocaulon scoparium</i> (Linnaeus) Kützing	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+										⑥+ ⑦+
<i>Dictyota dichotoma</i> (Hudson) J.V. Lamouroux 1809		⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+									⑥+ ⑦+
Rhodophyceae												
<i>Gracilaria verrucosa</i> (Hudson) Papenfuss 1950	⑥▲ ⑦▲	⑥▲ ⑦▲	⑥▲ ⑦▲	⑥▲ ⑦▲	⑥▲ ⑦▲					⑥▲ ⑦▲	⑥▲ ⑦▲	⑥▲ ⑦▲
<i>Laurencia papillosa</i> (C. Agardh) Greville 1830	①■ ②■	①■ ②■	①■ ②■	①■ ②■	①■ ②■	①■ ②■				①■ ②■	①■ ②■	①■ ②■
<i>Hypnea</i> sp. J.V. Lamouroux, 1813						⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+			
Monocots												
<i>Posidonia oceanica</i> (Linnaeus) Delile 1813	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+							⑥+ ⑦+	⑥+ ⑦+

Fiziksel ve Kimyasal Bulgular

Çamaltı tuzlası ekosisteminde sıcaklık değerleri 9-30 °C arasında değişim göstermiştir. Sıcaklığa ait en yüksek değer

Ağustos 2015'de en düşük ise Ocak 2015 tarihinde ölçülmüştür. Çalışma süresince pH 7-8 arasında değişmiştir. pH' nın yıllık ortalama değeri 8,01 olup en yüksek pH değeri

Eylül 2015 tarihinde 1. istasyonda, en düşük ise Eylül 2015'de 2. istasyonda kaydedilmiştir. Çözünmüş oksijen konsantrasyonu gölde 0,2–9,1 mg/L arasında olup yıllık ortalama değeri 5,6 mg/L'dir. En yüksek çözünmüş oksijen konsantrasyonu Şubat 2015'de en düşük Temmuz-Ağustos

2015'de ölçülmüştür. Meteorolojik veriler Davis Vantage Pro2 ölçüm cihazı ile ölçülüp, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle kıyaslanarak tespit edilmiştir (Tablo 2). Ekosistemde yapılan bazı fiziksel ölçümlere ve kimyasal analizlere ait sayısal veriler Şekil 3-6 ve Tablo 3 de sunulmuştur.

Tablo 2. Ege bölgesi (İzmir) Yıllık Mevsimsel İklim Değerleri (MGM, 2015. <http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=IZMIR#sfB>)

Table 2. Aegean Region (İzmir) Annual Seasonal Climate Values (MGM, 2015. <http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=IZMIR#sfB>)

İZMİR Zaman(yıl)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
	Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950- 2015)											
Ortalama Sıcaklık (°C)	8.9	9.5	11.7	15.9	20.8	25.6	28.0	27.7	23.7	18.8	14.0	10.6
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	12.5	13.5	16.3	20.9	26.0	30.7	33.2	32.9	29.1	23.9	18.5	14.1
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	5.9	6.2	7.8	11.3	15.5	20.0	22.6	22.5	18.7	14.7	10.7	7.7
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	4.2	5.1	6.2	7.5	9.5	11.3	12.1	11.5	10.1	7.3	5.3	4.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	11.9	10.8	9.2	8.2	5.4	2.1	0.5	0.5	2.0	5.6	8.9	12.5
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m ²)	125.1	101.9	75.6	46.4	30.9	9.8	1.8	2.6	15.0	45.3	94.8	141.1

Şekil 3. Aylık pH değişimleri
Figure 3. Monthly pH changes

Şekil 4. Aylık sıcaklık değişimleri
Figure 4. Monthly temperature changes

Şekil 5. Aylık tuzluluk değişimleri
Figure 5. Monthly salinity changes

Şekil 6. Aylık oksijen değişimleri
Figure 6. Monthly oxygen changes

Tablo 3. 2015 yılı aylık dönemlerde ölçülen ve hesaplanan kimyasal parametrelerin örnekleme istasyonlarına göre değerleri
Table 3. The values of the chemical parameters measured and calculated for the 2015 monthly periods according to the sampling stations

Zaman (2015 Yılı)								
Aylar								
Ocak:(Ock): Nisan: (Nsn), Haziran: (Hzn), Ağustos: (Ats), Eylül: (Eyl), Kasım (Ksm), Aralık: (Ark)								
Örnekleme istasyonları: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).								
Analitik Değişkenler	Ock	Nsn	Hzn	Ats	Eyl	Ksm	Ark	Analiz Yöntemi
Σ Fosfat (PO_4^{3-} µg/l)	0,30 ^① 0,36 ^② 0,32 ^③ 0,11 ^④ 0,13 ^⑤ 0,96 ^⑥ 0,71 ^⑦ 0,01 ^⑧	0,37 ^① 0,28 ^② 0,18 ^③ 0,15 ^④ 0,15 ^⑤ 1,2 ^⑥ 1,0 ^⑦ 0,01 ^⑧	1,9 ^① 2,3 ^② 1,9 ^③ 0,14 ^④ 0,96 ^⑤ 2,6 ^⑥ 3,0 ^⑦ 0,01 ^⑧	1,6 ^① 2,9 ^② 2,7 ^③ 1,1 ^④ 1,2 ^⑤ 2,8 ^⑥ 2,3 ^⑦ * ^⑧	1,7 ^① 2,9 ^② 2,3 ^③ 1,1 ^④ 1,9 ^⑤ 1,7 ^⑥ 1,5 ^⑦ * ^⑧	0,06 ^① 0,09 ^② 0,1 ^③ 0,07 ^④ 1,6 ^⑤ 0,2 ^⑥ 0,17 ^⑦ * ^⑧	0,08 ^⑥ 0,08 ^⑦ 0,01 ^③ 0,06 ^④ 0,96 ^⑤ 0,01 ^⑥ 0,01 ^⑦ 0,01 ^⑧	APHA 4500- PO_4
Nitrat (NO_3^- µg/l)	0,67 ^① 0,82 ^② 0,93 ^③ 0,78 ^④ 0,83 ^⑤ 0,62 ^⑥ 0,64 ^⑦ 0,00 ^⑧	0,27 ^① 0,66 ^② 0,74 ^③ 0,57 ^④ 0,51 ^⑤ 0,92 ^⑥ 0,96 ^⑦ 0,00 ^⑧	0,36 ^① 0,68 ^② 0,67 ^③ 0,57 ^④ 0,61 ^⑤ 1,2 ^⑥ 1,2 ^⑦ * ^⑧	0,67 ^① 0,84 ^② 0,96 ^③ 0,78 ^④ 0,93 ^⑤ 0,99 ^⑥ 0,97 ^⑦ * ^⑧	0,67 ^① 0,84 ^② 0,84 ^③ 0,48 ^④ 0,63 ^⑤ 0,17 ^⑥ 0,19 ^⑦ * ^⑧	0,47 ^① 0,34 ^② 0,46 ^③ 0,28 ^④ 0,53 ^⑤ 0,13 ^⑥ 0,13 ^⑦ * ^⑧	0,48 ^① 0,23 ^② 0,28 ^③ 0,18 ^④ 0,96 ^⑤ 0,11 ^⑥ 0,12 ^⑦ 0,00 ^⑧	APHA 4500- NO_3
Nitrit (NO_2^- µg/l)	0,06 ^① 0,46 ^② 1,10 ^③ 1,88 ^④ 1,34 ^⑤ 0,07 ^⑥ 0,05 ^⑦ 0,01 ^⑧	0,72 ^① 6,63 ^② 7,00 ^③ 1,56 ^④ 1,1 ^⑤ 0,13 ^⑥ 0,11 ^⑦ 0,00 ^⑧	0,78 ^① 10,8 ^② 0,74 ^③ 0,57 ^④ 0,51 ^⑤ 0,92 ^⑥ 0,96 ^⑦ 0,00 ^⑧	10,4 ^① 16,8 ^② 15,9 ^③ 1,34 ^④ 1,01 ^⑤ 0,07 ^⑥ 0,07 ^⑦ * ^⑧	8,9 ^① 11,8 ^② 11,5 ^③ 1,03 ^④ 0,98 ^⑤ 0,04 ^⑥ 0,05 ^⑦ * ^⑧	2,9 ^① 9,9 ^② 11,5 ^③ 1,1 ^④ 0,98 ^⑤ 0,04 ^⑥ 0,05 ^⑦ * ^⑧	1,4 ^① 6,5 ^② 11,5 ^③ 0,78 ^④ 0,98 ^⑤ 0,04 ^⑥ 0,04 ^⑦ * ^⑧	APHA 4500- NO_2

Amonyak (NH ₄ + µg/l)	0,33 ^① 0,35 ^② 0,33 ^③ 0,36 ^④ 0,57 ^⑤ 0,67 ^⑥ 0,70 ^⑦ 0,01 ^⑧	0,08 ^① 7,4 ^② 7,1 ^③ 3,1 ^④ 2,98 ^⑤ 0,07 ^⑥ 0,05 ^⑦ 0,01 ^⑧	0,06 ^① 13,4 ^② 12,1 ^③ 3,88 ^④ 2,34 ^⑤ 0,07 ^⑥ 0,05 ^⑦ 0,00 ^⑧	1,89 ^① 14,6 ^② 15,1 ^③ 2,77 ^④ 2,89 ^⑤ 0,16 ^⑥ 0,15 ^⑦ * ^⑧	1,9 ^① 15,3 ^② 15,1 ^③ 2,2 ^④ 3,6 ^⑤ 0,07 ^⑥ 0,05 ^⑦ * ^⑧	0,2 ^① 10,8 ^② 10,5 ^③ 1,9 ^④ 2,93 ^⑤ 0,09 ^⑥ 0,07 ^⑦ * ^⑧	0,24 ^① 0,54 ^② 0,48 ^③ 0,78 ^④ 0,93 ^⑤ 0,99 ^⑥ 0,97 ^⑦ * ^⑧	APHA 4500-NH ₃ H
Sülfat (SO ₄ ²⁻ mg/L)	1780 ^① 7480 ^② 7476 ^③ 8812 ^④ 9610 ^⑤ 3400 ^⑥ 3410 ^⑦ 10000 ^⑧	2360 ^① 7980 ^② 7996 ^③ 8898 ^④ 9780 ^⑤ 3400 ^⑥ 3410 ^⑦ 10000 ^⑧	3570 ^① 9800 ^② 9806 ^③ 8812 ^④ 9610 ^⑤ 3400 ^⑥ 3400 ^⑦ * ^⑧	3750 ^① 5774 ^② 5800 ^③ 6457 ^④ 18900 ^⑤ 3390 ^⑥ 3391 ^⑦ 1980 ^⑧	3200 ^① 5230 ^② 5300 ^③ 4000 ^④ 7000 ^⑤ 3200 ^⑥ 3240 ^⑦ * ^⑧	2320 ^① 3960 ^② 4350 ^③ 3400 ^④ 5680 ^⑤ 3200 ^⑥ 3200 ^⑦ * ^⑧	1670 ^① 4120 ^② 4890 ^③ 4300 ^④ 6200 ^⑤ 3230 ^⑥ 3238 ^⑦ *	APHA SO ₄
Chl. a µg/l	0,04 ^① 0,05 ^② 0,05 ^③ 0,04 ^④ 0,03 ^⑤ 0,03 ^⑥ 0,03 ^⑦ 0,0 ^⑧	0,56 ^① 0,40 ^② 0,45 ^③ 0,55 ^④ 0,43 ^⑤ 0,49 ^⑥ 0,41 ^⑦ 0,0 ^⑧	1,3 ^① 3,4 ^② 3,5 ^③ 1,9 ^④ 1,6 ^⑤ 0,9 ^⑥ 0,94 ^⑦ 0,1 ^⑧	2,9 ^① 2,5 ^② 2,6 ^③ 2,3 ^④ 1,5 ^⑤ 0,49 ^⑥ 0,41 ^⑦ *	1,7 ^① 1,9 ^② 2,1 ^③ 1,7 ^④ 0,98 ^⑤ 0,49 ^⑥ 0,41 ^⑦ *	2,9 ^① 2,5 ^② 2,6 ^③ 2,3 ^④ 1,5 ^⑤ 0,49 ^⑥ 0,41 ^⑦ *	0,23 ^① 0,33 ^② 0,35 ^③ 0,29 ^④ 0,12 ^⑤ 0,2 ^⑥ 0,19 ^⑦ 0,0 ^⑧	APHA (EPA 446.0, SM 10200 H.2.b.)
Magnezyum (Mg mg/l)	1357 ^① 5678 ^② 5700 ^③ 3200 ^④ 2700 ^⑤ 1260 ^⑥ 1270 ^⑦ 3340 ^⑧	1357 ^① 5678 ^② 5700 ^③ 3200 ^④ 2700 ^⑤ 1260 ^⑥ 1270 ^⑦ 3340 ^⑧	1290 ^① 4700 ^② 4760 ^③ 2200 ^④ 2700 ^⑤ 1260 ^⑥ 1210 ^⑦ 3500 ^⑧	1300 ^① 5200 ^② 5190 ^③ 1980 ^④ 1700 ^⑤ 1100 ^⑥ 111300 ^⑦ * ^⑧	1230 ^① 4560 ^② 4700 ^③ 1470 ^④ 1290 ^⑤ 1160 ^⑥ 1170 ^⑦ * ^⑧	1120 ^① 4100 ^② 4190 ^③ 1200 ^④ 1000 ^⑤ 1260 ^⑥ 1270 ^⑦ * ^⑧	1190 ^① 2890 ^② 2800 ^③ 1900 ^④ 1070 ^⑤ 1160 ^⑥ 1100 ^⑦ * ^⑧	TS EN ISO 11885

* Ölçüm yapılmadı: Havuzların yüksek tuzlulukta (~300 ppt) veya tuz hasadından dolayı boş olması

TARTIŞMA VE SONUÇ

Kıyusal deniz tuzlalarında ekosistemi etkileyen en önemli abiyotik etken tuz yoğunluğudur. Ekosistemi oluşturan tuz üretim havuzlarındaki tuz yoğunluğu, yalnızca biyolojik bileşenleri kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda üretilecek olan tuzun kalitesi ve miktarını da belirler. Bu yüzden tuz yoğunluğunun kontrolü, birinci dereceden önemli tek etkidir (Dolapsakis et.al, 2005; Davis, 2006). Tuzluluk değeri bakımından Çamaltı Tuzlası 4 ana kısma ayrılır. 1. Soğuk su havuzları (35-70 ppt), 2. Depo (Sergen) Havuzları (70-130 ppt), 3. Sıcak su Havuzları (130-250 ppt), 4. Kristalizasyon Havuzları (250-290 ppt). Tüm bu havuzların sayısı 155 adet olup her yıl fiziki altyapı bakımından farklı kullanım şekillerinde olabilmektedir. Havuzlardaki tuz yoğunluğunun, üretim sürecine bağlı olarak dengede tutulması ve korunmasında, Çamaltı tuzlasının bulunduğu coğrafik bölgedeki yıllık meteorolojik değerler de önemlidir. Havuzlardaki yüksek veya düşük tuzluluk, su devir daimini sağlayan (10-20 ton/dakika) pompalarla dengelenmektedir. Bu sayede her bir tuz üretim havuzundaki tuz yoğunluğu istenilen yoğunlukta tutulabilmektedir (Davis ve Giordano, 1996). Kıyusal deniz tuzlalarında, sudaki kimyasal değerler büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun sebebi, meteorolojik etkenlere bağlı olarak, sistemde oluşan buharlaşma (23-24 cm/m²) sonucu, su takviyesi yapılmasıyla sürekli olarak 10-20 ton/dakika suyun hareket halinde olmasıdır. Bu sebeple 700 µM' ye kadar amonyum ve 40 µM den fazla nitrat değerleri de tespit

edilebilmektedir (Du Toit, 2001). Tuz üretiminin başladığı Nisan ayından, tuzun elde edildiği Eylül ayına kadar ekosistemde buharlaşmaya bağlı olarak sürekli bir su devir daiminin oluşu, biyotik faktörleri de oldukça değişken kılmaktadır.

Çamaltı tuzlası ekosisteminde takson sayısı bakımından ilk sırada yer alan Bacillariophyceae sınıfından *Navicula* sp. hâkim tür olarak gözükmeyle beraber, Çamaltı tuzlasına has su devir daiminden dolayı, aslında sadece 1. ve 2. istasyonlarda mevcut bulunan bir takson olarak tespit edilmiştir. Bu istasyonlardan, tuzluluğu daha yüksek olan sahalar suyun sürekli, dakikada 10-20 ton pompalanmasından dolayı *Navicula* sp. rastlanmamıştır. Çamaltı tuzlası sulak alanında sistemin dinamiklerini etkileyen abiyotik ve biyotik özelliklere bakıldığında yaygın olarak bulunan alg türünün Chlorophyceae sınıfından (%24,13) 7 taksondan biri olan *Dunaliella* sp. olduğu tespit edilmiştir. Cyanophyceae sınıfı (%13,79) 4 takson ile yaygın olarak ekosistemde bulunmaktadır. Phaeophyceae sınıfından (%10,34), Çamaltı tuzlasının kıyusal alanında 3 takson tespit edilmiştir. 6. ve 7. İstasyon alanlarından deniz suyu çekilmesine rağmen ekosistemin içerisindeki yüksek tuz yoğunluğundan dolayı Phaeophyceae ve Monocots sınıfı alglerine rastlanmamıştır. Rhodophyceae sınıfı algleri 3 takson (%10,34) ile tespit edilmiştir. Bu taksonlardan sadece *Laurencia papillosa* ekosistemin içerisinde tuzluluğun 50-100 ppt olduğu alanlarda rastlanmıştır. *Gracilaria* sp., *Hypnea* sp. *Ulva* sp. ve *Enteromorpha* sp. makro algleri Çamaltı tuzlasının kıyusal deniz ekosisteminde tespit edilmiştir. *Enteromorpha* sp. Ocak-Mayıs

aylarında daha çok dağılım göstermektedir. Ancak *Ulva* sp. deniz suyundaki sıcaklık ve besin tuzlarının artışıdan dolayı yoğun miktarda bulunmaktadır. Bu sebeple de Çamaltı tuzlası kıyusal zonunda Mayıs ve Haziran aylarında kokuşmaya sebep olmaktadır.

Tuzlanın bulunduğu coğrafik bölgede endüstriyel ve kentsel oluşumların varlığı da suyun kalitesinde etken olabilmektedir. Çamaltı tuzlasından alınan su numunelerinde fiziksel ve kimyasal parametre analizi yapılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ndeki (Anonim, 2004; 2016) kıta içi su

kaynaklarının sınıflarına göre kalite ölçütleri ve suyun bazı parametrelere göre kalite sınıfları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tablo 4'teki değerlendirmeye bakıldığında, Çamaltı tuzlasının; sıcaklık, pH, nitrat ve toplam fosfor bakımından I. sınıf. Yalnız Temmuz, Ağustos aylarında ekosistemde göç eden Flamingo kuşlarının sayısının artmasına ve dışkılamaya bağlı olduğu düşünülen fosfor ve sülfat artışı tespit edilmiştir. Bu bakımdan da sülfat ve fosfor için IV. sınıf su kalitesine de girmektedir. Çözünmüş oksijen bakımından II. sınıf su kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir.

Tablo 4. T.C. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre ölçütleri (Anonim 2004; 2016)

Table 4. Republic of Turkey Water Pollution Control Directive Criteria for Classes of Inland Water Resources (Anonymous 2004;2016)

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Ölçütleri					
Su Kalitesi Değişkenleri	Su Kalitesi Sınıfı				
Fiziksel ve inorganik-kimyasal değişkenler	I.	II.	III.	IV.	Çamaltı Tuzlası Değerleri
Sıcaklık (°C)	25	25	30	>30	19,9
pH	6,5-8,5	6,5-8,6	6-9	>9	7,76
Çözünmüş oksijen (mg O ₂ /L)	8	6	3	>3	5,51
Sülfat iyonu (mg SO ₄ ⁼ /L)	200	200	400	>400	5300
Amonyum azotu (mg NH ₄ ⁺ -N/L)	0,2	1	2	>2	0,70-5,46
Nitrat azotu (mg NO ₃ ⁻ -N/L)	5	10	20	>20	0,33-1,65
Toplam fosfor (mg P/L)	0,02	0,16	0,65	>0,65	0,15-15,07

Çamaltı tuzlası ekosistemi; T.C. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü Sınır Değerleri olan pH, çözünmüş oksijen, toplam fosfor ve Klorofil-a bakımından "Ötrofikasyon kontrolü sınır değerleri" içerisinde yer almaktadır.

Yalnız özellikle Temmuz, Ağustos aylarında göçmen flamingo kuşlarının sayısının artışıdan dolayı olduğu

düşünülen sudaki kimyasal değerlerde geçici bir artış gözlenmiştir. Tablo 6'daki değerlendirmeye bakıldığında İzmir Çamaltı tuzlası fosfat bakımından yüksek mezotrofi ile ötrof seviyede; nitrat bakımından düşük mezotrofi ile ötrof seviyede; amonyak bakımından düşük mezotrofi ve ötrof seviyede; klorofil a değeri bakımından oligotrof ve ötrof seviyede görülmektedir.

Tablo 5. Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü Sınır Değerleri (Anonim 2004; 2016)

Table 5. Eutrophication Control of Lakes, Ponds, Swamps and Dam Reservoirs Boundary Values (Anonymous 2004;2016)

İstenilen Özellikler	Doğal koruma alanı ve rekreasyon	Çeşitli kullanımlar için (Doğal olarak tuzlu, acı ve sodalı göller dahil)	Çamaltı Tuzlası Değerleri
pH	6,5-8,5	6-10,5	6,9-8,1
Oksijen (mg/L)	7,5	5	5,3-7
Toplam fosfor (mg/L)	0,005	0,1	0,15-15,07
Klorofil- a (mg/L)	0,008 (8 µg/L)	0,025 (25 µg/L)	0,03-4,77

Tablo 6. Kıyılal bölgelere ait ötrifikasyona seviyeleri değlerlendirmesi (Simbouna et al., 2005)**Table 6.** Assessment of eutrophication levels of coastal zones (Simbouna et al., 2005)

Ötrifikasyona Değerleri					Çalışma Sonuçları Çamaltı Tuzlası
Parametre	Oligotrof	Düşük Mezotrofi	Yüksek Mezotrofi	Ötrof	
PO ₄ -3(μM)	<0,07	0,07-0,14	0,14-0,68	>0,68	0,15-15,07
NO ₃ -(μM)	<0,062	0,62-0,65	0,65-1,19	>1,19	0,33-1,65
NH ₄ +(μM)	<0,055	0,55-1,05	1,05-2,20	>2,20	0,70-5,46
Chl a (mg/l)	<0,10	0,1-0,6	0,6-2,21	>2,21	0,03-4,77

Yang et.al., (2008) in belirttiği Çin Çevre Koruma Kurumunun göl ya da rezervuar yüzey sularının kalitesi standartlarına göre de Çamaltı tuzlası su kalitesi sıcaklık, pH, çözülmüş oksijen değlerleri bakımından I. sınıf, Amonyum

azotu III.-IV. sınıf, nitrat azotu, fosfor ve klorofil a bakımından IV.-V. sınıf sular kapsamındadır. Ötrofikasyonlu sulardaki N ve P değlerleri bakımından fosfor açısından orta derecede ötrofik; azot bakımından oligotrofik sular kapsamındadır.

Tablo 7. Göl ya da rezervuar yüzey sularının kalitesi (Yang et.al., 2008)**Table 7.** The quality of surface water on lake or reservoir waters (Yang et.al., 2008)

Su Kalitesi Değişkenleri	Su Kalitesi Sınıfı					
Fiziksel ve inorganik-kimyasal değişkenler	I.	II.	III.	IV.	V.	Çamaltı Tuzlası Değerleri
Sıcaklık (°C)	Haftalık en fazla artış≤1 ve düşüş≤2					10,3-29,8
pH	6-9					6,9-8,1
Çözülmüş oksijen (mg O ₂ /L)	Saturasyon≥90%	≥6	≥5	≥3	≥2	5,3-7
Amonyum azotu (mg NH ₄ ⁺ -N/L)	≤0.15	≤0.5	≤1.0	≤1.5	≤2.0	0,70-5,46
Nitrat azotu (mg NO ₃ ⁻ -N/L)	≤0.06	≤0.1	≤0.15	≤1.0	>1.0	0,33-1,65
Toplam fosfor (mg P/L)	≤0.01	≤0.025	≤0.05	≤0.1	≤0.2	0,15-15,07
Klorofil- a (mg/L)	≤0.001	≤0.004	≤0.01	≤0.03	≤0.065	0,03-4,77

Ötrofikasyonlu sulardaki N ve P değlerleri

Parametre	Oligotrofik	Orta Derecede Ötrofik	Ötrofik	Hiperötrofik	Çamaltı Tuzlası Değerleri
Σ P (μg/L)	5~10	10~30	30~100	>100	0,15-15,07
Σ N (μg/L)	250~600	500~1100	1000~2000	>2000	0,33-1,65

Çamaltı tuzlası İzmir körfezinde insan müdahalesiyle tuz üretmek amacıyla oluşturulmuş bir sulak alandır. Tuz üretiminin gereği olarak akışkan bir su rejimine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı gerek yıllık meteorolojik eğişimler gerekse üretim süreciyle ilgili değişimlerden dolayı her yıl biyotik ve abiyotik özellikler bakımından farklılıklar gösterebilmektedir. Çalışmada 2015 yılına ait alg türlerinin dağılımı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler kapsamında Çamaltı tuzlasının abiyotik etkenlere bağlı olarak en yaygın bulunan alg türünün Cyanophyta grubundan *Dunaliella* spp. olduğu tespit edilmiştir. Geniş tuzluluk aralıklarına dayanıklı olan *Dunaliella* mikroalgleri ekosistemdeki farklı ve yoğun tuzluluk alanlarında dağılım gösterebilmektedir. 154 üretim havuzundan ancak 25 âdetinde tuzluluk 50 ppt, diğer 104 havuzda 50-300 ppt. tuzluluk değerlerinin olduğu bir sulak alanda diğer alg türleri yaygın olarak bulunamamaktadır. Mevsimsel olarak da her ay ekosistemde bulunan bir mikroalgdir. Ekosistemin kıyusal zonasyonunda her mevsim bulunan alg olarak *Cystoseria* türü

yaygındır. *Enteromorpha*, *Ulva* ve *Gracillaria* türleri de kıyusal alanda dağılım gösteren alglerdir. Çamaltı tuzlası insan yapımı bir sulak alan olarak Cyanophyceae sınıfına ait 4, Chlorophyceae sınıfına ait 7, Bacillariophyceae 11 takson, Phaophyceae sınıfına ait 3 takson, Rhodophyceae sınıfına ait 3 takson ve Monocots sınıfına ait 1 takson olmak üzere toplam 29 takson ile sürekli değişken yapısıyla dinamik bir ekosistemdir. Bu çalışmayla ülkemizin en büyük tuzlası olan İzmir Çamaltı tuzlasında dağılım gösteren alg türleri araştırılmış olup, Türkiye tuzlalarındaki algler hakkındaki bilgilere katkı yapılması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen tür sayısı az olmakla birlikte, tespit edilen türlerin tuzludan ilk defa kayıt ediliyor olması, konu hakkındaki bilgi boşluğunun doldurulmasına katkı yapıldığını göstermektedir. Ülkedeki tuzlu ekosistemler genelinde yapılacak biyoçeşitlilik çalışmalarıyla, biyolojik zenginliğimiz ortaya çıkarılabilecek, tespit edilen türlerin korunması, akuakültürde ve sanayide değerlendirilmesi yönünde adımlar atılabilecektir.

KAYNAKÇA

- Anonim (2004). Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği, 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete, No:25687. Alıntılanma adresi: <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/12/Su%20Kirlili%C4%9F%20ekleri.htm> (1.09.2017)
- Anonim (2016). Su Kirliliği kontrolü yönetmeliği. Alıntılanma adresi: <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?Kod=7.5.7221&sourceXmlSearch=&MevzuatTliski=0>. (18.09.2016).
- APHA (1992). Standarts Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association 18th Edition, (Eds: Arnold E. Greenberg, Lenore S. Clesceri, Andrew D. Eaton, Marry Ann H. Franson) Washington, D.C. ISBN: 0-875553-207-1
- Ak, İ. (2008). Türkiye'de Farklı Tuz Göllerinden İzole Edilen *Dunaliella viridis*' de Büyüme Koşullarının ve Karotenoid Birikiminin Araştırılması, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Çanakkale.
- Arora, M., Anil, C.A., Leliaert, F., Delany, J. & Mesbahi, E. (2013). *Tetraselmis indica* (Chlorodendrophyceae, Chlorophyta), a new species isolated from salt pans in Goa, India. *European Journal of Phycology*, 48(1):61-78. doi: 10.1080/09670262.2013.768357
- Algaebase. (2017). Listing the World's Algae. Alıntılanma adresi: <http://www.algaebase.org/search/commonnames> (29.05.2017)
- Bourrelley, P. (1968). *Les Algues d'eau douce. Initiation à la systématique. Tome 2: Les Algues jaunes et brunes. Chrysophycées, Phéophycées, Xanthophycées et Diatomées*. Paris, Boubée éd., 438 p. France.
- Bourrelley, P. (1970). *Les Algues d'eau douce. Initiation à la systématique. Tome 3: Les Algues bleues et rouges. Les Eugléniens, Péridiniens et Cryptomonadines*. Paris, Boubée éd., 512 p. France.
- Bourrelley, P. & A. Couté. (1991). Desmidiées de Madagascar (Chlorophyta, Zygothycées), *Bibliotheca Phycologica*, Band 86, 348 p. France.
- Borowitzka M.A. (1997). Microalgae for aquaculture: opportunities and constraints. *Journal of Applied Phycology*. 9:393-401. doi: 10.1023/A:1007921728300
- Cheng L. (1991). *Proceedings of the International Symposium on Biotechnology of Salt Ponds*, Tangu, Tianjin, P.R. China, L. Cheng (ed.), *Proceedings of the International Symposium on Biotechnology of Salt Ponds* 18-21 September 1990. (283 pp.), Salt Research Institute, Ministry of Light Industry, Tianjin, China.
- Davis, J.S. & Giordano, M. (1996). Biological and physical events involved in the origin, effects, and control of organic matter in solar saltworks. *International Journal of Salt Lake Research* 4:335-347. doi: 10.1007/BF01999117
- Du Toit, S.R. (2001). Biological management of South African solar saltworks. PhD thesis, University of Port Elizabeth, 260 pg.
- Dolapsakis N., Tafas T., Abatzopoulos T., Ziller S. & Economou-Amilli A. (2005). Abundance and growth response of microalgae at Megalon Embolon solar saltworks in northern Greece: An aquaculture prospect, *Journal of Applied Phycology*, 17:39-49. doi: 10.1007/s10811-005-5553-0
- Davis J.S. (2006). Biological and physical management information for commercial solar saltworks, In: Ecological importance of solar saltworks, Lekkas T.D. and Korovessis N.A.(eds.), *Proceedings of the 1st International Conference on the Ecological Importance of Solar Saltworks (CEISSA 06)*, Santorini Island, Greece, 20-22 October 2006, GlobalNEST, Athens. doi: 10.1007/BF01999117
- EN ISO 11885 (2009). TSE, Su kalitesi- Seçilmiş elementlerin tümevarımıla olarak bağlanmış plazma optik emisyon spektrometresiyle (ICP-OES) tayini, EN ISO 11885:2009. Alıntılanma adresi: <https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/Standard.aspx?1.01.2015>
- Google Earth (2017). Alıntılanma adresi: <https://www.google.com/intl/tr/earth/> (5.06.2017).
- Hof, T. & Frémy, P. (1933). On Myxophyceae living in Strong brines. *Recueil Travaux Botaniques Netherlands* 30:140-162.
- Hecky, E.R. & Kilham, P. (1973). Diatoms in Alkaline, Saline Lakes: Ecology and Geochemical Implications, *Limnology and Oceanography*, January 1973, 18(1). doi: 10.4319/lo.1973.18.1.0053
- IOC-UNESCO. (2017). Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae, Alıntılanma adresi: <http://www.marinespecies.org/hab/index.php> (01.06.2017).
- Koray, T., Yurga, L. & Çolak-Sabancı. (2007). Türkiye Denizleri Mikroplankton (=Protista) Türlerinin Kontrol Listesi ve Tür Tayin Atlası. Proje No: TBAG-2239 (102T174). 154 pp.
- Korovessis N.A. & Lekkas T.D. (2000). Saltworks: Preserving Saline Coastal Ecosystems. *Post Conference Symposium Proceedings. 6th Conference on Environmental Science and Technology*, Pythagorian, Samos, 1 September 1999, 95 pp. Global Nest, Athens.
- LPSN. (2017). List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature, Alıntılanma adresi: <http://www.bacterio.net> also see <http://www.microbiologyonline.org.uk/home> (23.05.2017).

- MGM. (2015). Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Alıntılanma adresi: <http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=izmir#sfb> (23.05.2016)
- Nübel, U., Garcia-Pichel, F. & Muyzer, G. (2000). The halotolerance and phylogeny of cyanobacteria with tightly coiled trichomes (*Spirulina* Turpin) and the description of *Halospirulina tapeticola* gen. nov., sp. nov. *International Journal of Systematic Evolutionary Microbiology* 50:1265-1277. doi:10.1099/ijsem.0.002357
- Nagasathya, A. & Thajuddin, N. (2008). Cyanobacterial Diversity in the Hypersaline Environment of the Saltpans of Southeastern Coast of India, *Asian Journal of Plant Sciences* 7(5): 473-478, ISSN: 1682-3974. doi:10.3923/ajps.2008.473.478
- Oren, A. (2005). A hundred years of *Dunaliella* research: 1905–2005, *Salina Systems*, 1,2, doi:10.1186/1746-1448-1-2
- Pritchard, D. (2010). Managing wetlands: Frameworks for Managing Wetlands of International Importance and other wetland sites. *Ramsar Handbooks for the Wise use of Wetlands*, 4th Edition, Vol. 18. Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland. Alıntılanma adresi: <http://www.ramsar.org> (20.06.2017).
- Plankweb. (2017). Check-list of Turkish Seas Microplankton Alıntılanma adresi: <http://plankweb. Check-list of Turkish Seas Microplankton> (15.06.2017).
- Simboura, N., Panayotidis, P. & Papathanassiou, E. (2005). A synthesis of the biological quality elements for the implementation of the European Water Framework Directive in the Mediterranean ecoregion: The case of saronikos Gulf. *Ecological Indicators* 5:253–266. doi: 10.1016/j.ecolind.2005.03.006
- UNEP. (2013). The Spanish saltworks areas, "Las Salinas", on the islands of Ibiza and Formentera at UNEP's World Conservation Monitoring Centre. Alıntılanma adresi: <http://www.unepwcmc> (10.06.2017)
- Yang, X., Wu, X., Hao, H. & He, Z. (2008). Mechanisms and assessment of water eutrophication, *Journal of Zhejiang University SCIENCE B*, 9(3):197-209, ISSN 1862-1783.
- Yurga, L. (2015). Distribution of phytoplankton species in Izmir Bay for 15 years and its comparative statistical analysis. *Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 32(1):25-30. doi: 10.12714/egejfas.2015.32.1.04
- WoRMS. (2016). World Register Marine Species, Alıntılanma adresi: <http://www.marinespecies.org/index.php> (29.05.2017).