



Original Research / Özgün Araştırma

Rational Use of Medicines by Mothers Having Children Under Five Years Old and Factors Affecting Their Medication Use

Beş Yaş Altı Çocuğu Olan Annelerin Akılçılık İlaç Kullanım Durumu ve Etkileyen Etmenler

Ayça Seda ÇINAR¹, Yeliz MERCAN²

ABSTRACT

Aim: In this study, it was aimed to determine mothers' Rational Use of Medicines (RUM) having children under five years old, and factors affecting their medication use. **Method:** This descriptive and cross-sectional study was performed in Pinarhisar, a district of Kırklareli, a province in northwestern Turkey, between June 2015 and March 2016. The study sample consisted of 320 women having 0-59-months old children enrolled in Family Health Centers. The data were collected through face-to-face interviews using the Questionnaire developed by the researchers. **Results:** The rate of RUM among the participants was 30.0%. The rate of taking over-the-counter medication, and antibiotics without a prescription among the women was 90.0% and 19.1% respectively. The rate of the women who gave over-the-counter medication, and antibiotics without a prescription to their children was 66.3% and 6.3% respectively. Of the participants, 38.4% had medication at home to use just in case and 33.4% took medication upon others' advice. The rates of correct responses given by the mothers to questions on antibiotic use ranged between 18.8% and 52.2%. In the multivariate logistic regression analysis, the rate of rational use of medicines was higher in those who had a nuclear family, those whose income was above the minimum wage (1400-2800 Turkish liras), those who were aware that the effectiveness of the drug would not increase as the drug price increased, and those who were aware of the rational use of drugs than it was in those whose income was below the minimum wage (<1400 Turkish liras), those who had a large or fragmented family, those who were not aware that the effectiveness of the drug would not increase as the drug price increased, and those who were not aware of the rational use of drugs respectively. **Conclusion:** About one out of three mothers who had children under the age of five used drugs rationally. Among the mothers, the rate of taking over-the-counter medication and antibiotics without a prescription for themselves was higher than the rate of giving them to their children. Among the determinants of rational use of medication were the family type, income level, and the level of knowledge or awareness of RUM. When mothers having children under the age of five present to health institutions, the interview processes should be evaluated well, educational studies should be planned for them and their participation in these studies should be ensured.

Keywords: Rational use of medicine, irrational use of medicine, non-prescription medicines, use of antibiotics without a prescription, child, mother

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, beş yaş altı çocuğu olan annelerin akılçılık ilaç kullanım (AİK) durumunun belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. **Yöntem:** Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırma, Haziran 2015- Mart 2016 tarihleri arasında Pınarhisar'da yürütülmüştür. Araştırmanın örneğini, Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı 0-59 aylık çocuğu olan 320 kadın oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu yardımıyla yüz yüze toplanmıştır. **Bulgular:** Katılımcıların AİK prevalansı %30,0 saptanmıştır. Kadınların reçetesiz ilaç ve reçetesiz antibiyotik kullanım prevalansı sırasıyla %90,0 ve %19,1 idi. Kadınların çocuklarına yönelik reçetesiz ilaç ve reçetesiz antibiyotik kullanım prevalansı sırasıyla %66,3 ve %6,3 bulunmuştur. Grubun %38,4'ünün evde ilaç bulundurduğu, %33,4'ünün tavsiye ile ilaç kullandığı saptanmıştır. Annelerin %18,8-%52,2'si antibiyotik kullanımına yönelik doğru bilgiye sahip olduğu görülmüştür. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde; geniş veya parçallanmış aile yapısına sahip olanlara göre çekirdek ailede yaşayanların, asgari ücretin altında (<1400 TL) geliri olanlara göre 1400-2800 TL geliri olanların, ilaç fiyatı artukça ilacın etkinliğinin artmadığını bileyenlerin ve ilaçların akılçılık kullanımı ile ilgili farkındalık olanların, ilaçları akılçılık kullanma olasılığı yüksek saptanmıştır. **Sonuç:** Beş yaş altı çocuğu olan yaklaşık üç anneden biri ilaçları akılçılık kullanmaktadır. Annelerin kendilerine yönelik reçetesiz ilaç kullanımını ve reçetesiz antibiyotik kullanımını çocuklarına kıyasla yüksek düzeydedir. İlaçların akılçılık kullanımında aile tipi, gelir düzeyi, AİK bilgi veya farkındalık düzeyi belirleyici olarak saptanmıştır. Beş yaş altı çocuğu olan annelerin sağlık kuruluşlarına başvurularında, görüşme süreçleri iyi değerlendirilmeli, eğitim çalışmaları planlanmalı ve katılımları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akılçılık ilaç kullanımı, akılçılık olmayan ilaç kullanımı, reçetesiz ilaç kullanımı, reçetesiz antibiyotik kullanımı, çocuk, anne

Received / Geliş tarihi: 16.05.2020, **Accepted / Kabul tarihi:** 12.07.2020

¹ Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kırklareli, TÜRKİYE

² Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Kırklareli, TÜRKİYE

*Address for Correspondence / Yazışma Adresi: Yeliz Mercan. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü, 39000 Kırklareli-TÜRKİYE. E-mail: mercan.yeliz@gmail.com

Çınar AS. Mercan Y. Beş Yaş Altı Çocuğu Olan Annelerin Akılçılık İlaç Kullanım Durumu ve Etkileyen Etmenler. TJFMP, 2020;14(4): 530-539.

DOI: 10.21763/tjfmpc.738244

GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü, akılcı ilaç kullanımını (AİK) “hastaların klinik gereksinimleri için en uygun olan ilacı, bireysel gereksinimlerini karşılayan dozlarda, yeterli süre boyunca, kendilerine ve topluma en düşük maliyetle kullanmaları” şeklinde tanımlanmıştır.¹ AİK, hastaların sorunlarının doğru bir şekilde tanımlanması, tedavi amacının saptanması, farklı seçenekler içerisinde etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir tedavi yönteminin belirlenmesi, daha sonra ise uygun reçete hazırlanarak hastalara verilecek olan anlaşılır bilgiler ve önerilerle tedaviye başlanması, tedaviden elde edilen sonuçların takibi ve değerlendirilmesi gibi çok sayıda süreci içine alan sistematik bir yaklaşımındır.²

Dünyada, yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı toplum sağlığını etkileyen en önemli sorunların başında yer almaktır, ilaçların yarından fazlası uygun olmayan şekillerde reçete edilmekte, temin edilmekte ya da satılmaktadır.³ Bu durum, hastaların tedaviye uyumlarında azalma, ilaç etkileşimleri, ilaçlara karşı direnç gelişimi, hastalıkların yinelenmesi veya uzaması, hastane yatışlarında ve tedavi maliyetlerinde artış gibi pek çok sorun ortaya çıkarmaktadır.^{4,5} Bunlardan en önemlisi, antibiyotik direnci olup, günümüzün küresel sağlığı, gıda güvenliği ve gelişimi için en büyük tehditlerden birisi olarak bildirilmektedir.^{5,6} Dünyada verisi olan ülkeler arasında, Türkiye 2014 yılında kişi başı antibiyotik tüketiminde birinci sırada (%41,4), antimikrobal direnç sıralamasında ikinci sırada yer aldığı rapor edilmiştir.⁶

Toplum tabanlı yürütülen uluslararası ve ulusal çalışmalarda, AİK sıklıkları %24-%64,2 arasında bildirilmiştir.⁷⁻⁹ İlaçların akılcı kullanımında yaş, bilgi, motivasyon ve davranış becerileri gibi faktörler belirleyicidir.¹⁰ Akılcı olmayan ilaç kullanımı olarak ifade edilen gereginden çok ilaç reçete edilmesi, reçetesiz ilaç kullanılması, ilaçların yanlış kullanılması, gereksiz yere pahalı olan ilaçların kullanılması, gereksiz antibiyotik kullanılması gibi uygunsuz kullanımda temel sorun sağlık bilgisinin yetersiz olması olarak gösterilmiştir.^{1,11,12} Diğer nedenler arasında, eğitim düzeyi, yaşanan bölge, çalışma durumu, gelir düzeyi, sosyal güvence varlığı gibi sosyodemografik özellikler ve sosyokültürel faktörler gösterilmiştir.^{7,13-15}

İlaçların akılcı kullanımında, başta hekim olmak üzere, eczacı, hemşire, hasta ve yakınları, devlet, ilaç endüstrisi, eğitim kurumları ve medya gibi paydaşlar sorumludur.^{4,16} AİK'in talep ayağını oluşturan hasta veya yakınlarının hekime danışmadan ilaç alıp kullanmaları, ilaç tavsiye etmeleri veya başkalarının tavsiyesiyle ilaç

kullanmaları, evde ilaç depolamaları, önceki deneyimlerine dayanarak evdeki ilaçlardan kullanmaları, hekim tarafından reçete edilen ilaçları zamanında almamaları, uygun doz ve tavsiye edilen süre kullanmamaları akılcı olmayan ilaç kullanımı sorunlarını ortaya çıkarmakta ve paydaşların sorumlulukları da bu konular hakkında olmaktadır.⁴

Ebeveynlerin, akılcı olmayan ilaç uygulamaları, çocukların da reçetesiz ilaç ve reçetesiz antibiyotik kullanım sikliğini artırmaktadır.^{17,18} Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarına yönelik çoklu ilaç kullanımlarında, ilaç ölçüği ayarlamasında, ilaçların besinler ile karıştırılması gibi konularda hatalar yaptıkları bildirilmiştir.^{12,19} Bu araştırmada, annelerin çocuklarına yönelik ilaçların akılcı kullanımını hasta ve hasta yakını sorumluluğu olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, araştırmada beş yaş altı çocuğu olan annelerin AİK durumunu belirlemek ve etkileyen etmenleri saptamak amaçlanmıştır.

MATERIAL VE METOD

Araştırma Tasarımı

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma, Kırklareli Pınarhisar'da, Haziran 2015-Mart 2016 arasında yürütülmüştür. Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezine bağlı üç tane Aile Sağlığı Merkezi (ASM) vardır ve bu ASM'lere kayıtlı 0-59 ay çocuğu olan, toplam 677 anne araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Oranlarda evreni bilinen örnek büyülüklüğü formülü kullanılarak hesaplanan örnek büyülüklüğü 246 olarak belirlenmiş, %30 artırılarak 320 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmada, sistematik örneklemeye yöntemi kullanılmıştır. ASM'ye kayıtlı 59 aydan küçük çocuğu olan annelerin listeleri elde edilmiş, evrenin örnek büyülüğe oranına göre, ikişer kişi atlanarak listelerden kimlere gidileceği belirlenmiştir. Bu kişilere telefon ile ulaşılmış, randevu alınarak evlerinde ziyaret edilmiştir. Araştırma sonunda hedeflenen annelerin tamamına ulaşılmıştır (n=320).

Dahil Edilme Kriterleri

Belirlenen üç ASM'den birinde kayıtlı olma, 59 ay ve daha küçük yaşta çocuğu sahip olma, anket sorularına yanıt verecek bilişsel yeterliliği bulunma ve araştırmaya katılmaya gönüllü olma araştırmanın dahil edilme kriterleri arasındadır. Telefon ile ulaşılmayan ve adresleri bilinen anneler doğrudan evlerinde ziyaret edilmiş, iki farklı zamanda yapılan ev ziyaretine rağmen evlerinde bulunamayan anneler araştırmada kapsam dışı bırakılmıştır.

Veri Toplama Aracı

Veriler, araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen anket formu yardımıyla yüz yüze

görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplama araçlarının uygulanması, araştırmacı tarafından yaklaşık 35 dakika sürmüştür. Araştırmada, anketlerin uygulama öncesiinde katılımcılardan “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” ile yazılı onam alınmıştır.

Araştırmmanın Değişkenleri

Araştırmmanın bağımlı değişkeni “Akılçı İlaç Kullanımı (AİK)”dır. “Size göre akılçı ilaç kullanımı aşağıdakilerden hangi uygulamaları içerir?” sorusunda “Hastalığa uygun ilaç kullanma, Doktorun önerdiği miktarda kullanma, İlaç içme saatlerinin düzenli olması, Doğru uygulama yoluyla kullanma, Maliyeti uygun ilaç kullanma” seçeneklerinin hepsini işaretleyenler “Akılçı ilaç kullanıyor” olarak kabul edilmiştir. Yaş, eğitim durumu gibi sosyodemografik özellikler, kronik veya sistemik hastalık varlığı gibi bazı tanımlayıcı özellikler, reçetesiz ilaç kullanımı, evde ilaç bulundurma durumu gibi AİK’i belirleyen bazı özellikler ve uygulamalar, AİK bilgi düzeyine yönelik sorular araştırmmanın bağımsız değişkenleridir. Aylık gelir düzeyi Türk Lirası (TL) cinsinden, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının 2016 yılı asgari ücret sınırları (< 1400 TL) esas alınarak sınıflandırılmıştır.

Verilerin Analizi

Çözümlemede tanımlayıcı testlerden sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Bağımsız gruptarda oranların karşılaştırmasında Pearson Ki-Kare Testi ve Fisher’ın Kesin Ki-Kare Testi kullanılmıştır. İleri analizler için Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi kullanılmış, modellerin açıklayıcılığı Nagelkerke R square (Nagelkerke R²) ile gösterilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Veriler IBM-SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir.

Etki Onay

Araştırma için, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulundan etik kurul onayı alınmıştır (P018R00/ 11.03.2016). Araştırmmanın yürütülebilmesi için, Kırklareli ili Pınarhisar İlçe Kaymakamlığı (E.318/07.03.2016) ve Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden resmi izin alınmıştır (21221207/12.05.2016).

BULGULAR

Tablo 1’de araştırma grubunun sosyo-demografik özellikleri sunulmuştur. Grubun yaş ortalaması $31,41 \pm 4,98$ (Min:19, Max:46)’dır. Annelerin %38,4’ü lise mezunu, %77,8’i en uzun süre ilçe merkezinde yaşamış, %97,5’i evli, %79,4’ü çekirdek aileye sahip, %51,9’unun toplam iki çocuğu vardır. Katılımcıların %76,3’ü ev hanımı, %76,6’sı gelir getiren bir işte çalışmamakta ve %19,1’inin asgari ücretin altında (2016 yılı <1400 TL) aylık geliri vardır.

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı (n=320)

Değişkenler	n	%
Yaş(Ort±ss:31,41±4,98, Min: 19, Max: 46)		
< 35	231	72,1
≥ 35	89	27,9
Eğitim durumu		
İlkokul ve altı	65	20,3
Ortaokul	57	17,8
Lise	123	38,4
Üniversite ve üzeri	75	23,4
En uzun süre yaşanılan yer		
İl merkezi	20	6,2
İlçe merkezi	249	77,8
Kasaba/köy	51	15,9
Medeni durum		
Evli	312	97,5
Boşanmış veya eşi	8	2,5
ölmüş		
Aile tipi		
Çekirdek	254	79,4
Geniş	58	18,1
Parçalanmış	8	2,5
Yaşayan toplam çocuk sayısı		
1	94	29,4
2	166	51,9
≥ 3	60	18,8
Meslek		
Memur	47	14,6
İşçi	17	5,3
Serbest çalışan	12	3,8
Ev hanımı	244	76,3
Çalışma durumu		
Evet	75	23,4
Hayır	245	76,6
Aylık gelir düzeyi		
< 1400 TL	61	19,1
1400-2800 TL	165	51,6
≥ 2800 TL	94	29,4

Tablo 2’de katılımcıların bazı tanımlayıcı özellikleri, AİK’e yönelik uygulamaları ve bilgi düzeyleri ile ilgili özellikler sunulmuştur. Annelerin %14,7’sinde, çocukların %4,4’ünde kronik veya sistemik bir hastalık vardır. Annelerin %90,0’ı kendisi hastalandığında ve %66,3’ü çocuğu hastalandığında reçetesiz herhangi bir ilaç kullanmaktadır. Annelerin %19,1’i kendisine, %6,3’ü çocuklarına yönelik reçetesiz antibiyotik kullanmaktadır. Katılımcıların %38,4’ünün evde ilaç bulundurduğu, %33,4’ünün hastalandığında tavsiye ile ilaç kullandığı belirlenmiştir. Annelerin %18,8’i antibiyotiklerin soğuk algınlığı, grip gibi viral hastalıkları tedavi etmediğini, %37,2’si antibiyotiklerin ateş düşürücü özelliği olmadığını, %35,3’ü antibiyotiklerin burun akıntısı ve öksürüğün hafifletme özelliğini olmadığını bilmektedir. Grubun %46,6’sı antibiyotiklerin önerilen süreden kısa veya

uzun kullanılması durumunda, %52,2'si gereksiz kullanımında antibiyotik direncinin oluştuğunu, %74,1'i ilacın fiyatı arttıkça etkinliğinin artmadığını bilmektedir. Katılımcıların %18,8'i AİK konusunda bilgisinin olduğunu ifade etmiş, AİK ile ilgili uygulamalarda en fazla doktorun

önerdiği miktarda kullanma (%87,2), hastalığa uygun ilaç kullanma (%85,7), ilaç içme saatlerinin düzenli olması (%77,4) yanıtlarını vermiştir. Katılımcıların AİK prevalansı %30,0, akılçıl olmayan ilaç kullanımı prevalansı %70,0 olarak bulunmuştur (Tablo 2).

Tablo 2. Katılımcıların bazı tanımlayıcı özellikleri, AİK'e yönelik uygulamaları ve bilgi düzeyleri ile ilgili özellikler (n=320)

<i>Değişkenler</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
Annenin sistemik ya da kronik hastalık varlığı		
Evet	47	14,7
Hayır	273	85,3
Çocuğun sürekli ilaç kullanmayı gerektiren hastalık varlığı		
Evet	14	4,4
Hayır	306	95,6
Annenin kendisine yönelik reçetesiz ilaç kullanma durumu		
Kullanıyor	288	90,0
Kullanmıyor	32	10,0
Çocuklarına yönelik reçetesiz ilaç kullanma durumu		
Kullanıyor	212	66,3
Kullanmıyor	108	33,7
Annenin kendisine yönelik reçetesiz antibiyotik kullanma durumu		
Kullanıyor	61	19,1
Kullanmıyor	259	80,9
Çocuklara reçetesiz antibiyotik kullanma durumu		
Kullanıyor	20	6,3
Kullanmıyor	300	93,8
Evde ilaç bulundurma		
Hayır	197	61,6
Evet	123	38,4
Tavsiye ile kendine ilaç kullanma durumu		
Kullanıyor	107	33,4
Kullanmıyor	213	66,6
Antibiyotikler soğuk algınlığı, grip gibi viral hastalıkları tedavi eder mi?		
Evet	172	53,8
Hayır (doğru)	60	18,8
Fikrim yok	88	27,5
Antibiyotiklerin ateş düşürücü özelliği var mıdır?		
Evet	101	31,6
Hayır (doğru)	119	37,2
Fikrim yok	100	31,2
Antibiyotiklerin burun akıntısı ve öksürügü hafifletme özelliği var mıdır?		
Evet	121	37,8
Hayır (doğru)	113	35,3
Fikrim yok	86	26,9
Antibiyotikler, önerilen süreden kısa veya uzun kullanılırsa antibiyotik direnci oluşur mu?		
Evet (doğru)	149	46,6
Hayır	48	15,0
Fikrim yok	123	38,4
Gereksiz antibiyotik kullanımı durumunda antibiyotik direnci oluşur mu?		
Evet (doğru)	167	52,2
Hayır	30	9,4
Fikrim yok	123	38,4
İlaç fiyatı arttıkça ilacın etkinliği de artar mı?		
Evet	40	12,5
Hayır (doğru)	237	74,1
Fikrim yok	43	13,4
Akılçılık kullanımıyla ilgili bilgi farkındalığı		
Evet, biliyorum	60	18,8
Evet, daha önce duymuştum ama fazla bir bilgim yok	73	22,8
Hayır, hiç duymadım	187	58,4
*Akılçılık kullanımının içeriği uygulamalar		
Doktorun önerdiği miktarda kullanma	116	87,2
Hastalığa uygun ilaç kullanma	114	85,7
İlaç içme saatlerinin düzenli olması	103	77,4
Doğru uygulama yoluyla kullanma	86	64,7
Maliyeti uygun olan ilaç kullanma	28	21,1
Yeterli bilgilendirme yapıldıktan sonra kullanma	74	55,6
Akılçılık kullanımını		
Evet	96	30,0
Hayır	224	70,0

*Birden çok seçenek işaretlenmiştir.

Tablo 3'de, katılımcıların AİK durumuna göre bazı tanımlayıcı özelliklerinin karşılaştırması gösterilmiştir. Katılımcıların AİK durumu ile eğitim durumu ($p <0,001$), en uzun süre yaşanan yer ($p=0,044$), aile tipi ($p=0,019$), meslek ($p <0,001$), çalışma durumu ($p <0,001$), aylık gelir düzeyi ($p <0,000$) ile arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Evde ilaç bulunduran ($p=0,048$), antibiyotiklerin önerilen süreden kısa

veya uzun kullanıldığından antibiyotik direnci oluşacağını bilmeyen ($p<0,001$), gereksiz antibiyotik kullanılması durumunda antibiyotik direnci oluşacağını bilmeyen ($p=0,001$), ilaç fiyatı arttıkça ilaçın etkinliğinin artacağını bildiren ($p<0,001$) ve AİK konusunda farkındalığı olmayan katılımcıların ($p<0,001$) AİK oranları değişkenlerin diğer kategorilerine göre düşük düzeydedir.

Tablo 3. Katılımcıların AİK durumuna göre bazı tanımlayıcı özelliklerinin karşılaştırması (n=320)

Değişkenler	Evet		Hayır		p
	n	%	n	%	
Yaş					
< 35	66	28,6	165	71,4	
≥ 35	30	33,7	59	66,3	0,369
Eğitim Durumu					
İlkokul ve altı	12	18,5	53	81,5	<0,001
Lise ve orta	44	24,4	136	75,6	
Üniversite ve üzeri	40	53,3	35	46,7	
En uzun süre yaşanan yer					
İl merkezi	10	50,0	10	50,0	0,044
İlçe, kasaba/ köy	86	28,7	214	71,3	
Medeni durum					
Evli	95	30,4	217	69,6	0,443†
Evli değil	1	12,5	7	87,5	
Aile tipi					
Çekirdek aile	84	33,1	170	66,9	0,019
Geniş veya Parçalanmış	12	18,2	54	81,8	
Yaşayan toplam çocuk sayısı					
1	31	33,0	63	67,0	0,453
≥ 2	65	28,8	161	71,2	
Meslek					
Memur	28	59,6	19	40,4	<0,001
Memur değil	68	24,9	205	75,1	
Çalışma durumu					
Evet	42	56,0	33	44,0	<0,001
Hayır	54	22,0	191	78,0	
Aylık gelir düzeyi					
< 1400 TL	9	14,8	52	85,2	<0,001
1400-2800 TL	35	21,2	130	78,8	
≥ 2800 TL	52	55,3	42	44,7	
Annenin sistemik ya da kronik hastalık varlığı					
Evet	12	25,5	35	74,5	0,469
Hayır	84	30,8	189	69,2	
Çocuğun sürekli ilaç kullanmayı gerektiren hastalık varlığı					
Evet	5	35,7	9	64,3	0,633
Hayır	91	29,7	215	70,3	
Annenin kendisine yönelik reçetesiz ilaç kullanma durumu					
Kullanmıyor	13	40,6	19	59,4	0,167
Kullanyor	83	28,8	205	71,2	
Çocuklarına yönelik reçetesiz ilaç kullanma durumu					
Kullanmıyor	34	31,5	74	68,5	0,680
Kullanyor	62	29,2	150	70,8	
Annenin kendisine yönelik reçetesiz antibiyotik kullanma durumu					
Kullanmıyor	72	27,8	187	72,2	0,077
Kullanyor	24	39,3	37	60,7	
Çocuklara reçetesiz antibiyotik kullanma durumu					
Kullanmıyor	92	30,7	208	69,3	0,313
Kullanyor	4	20,0	16	80,0	
Evde ilaç bulundurma durumu					
Hayır	67	34,0	130	66,0	0,048
Evet	29	23,6	94	76,4	
Tavsiye ile kendine ilaç kullanma					
Kullanmıyor	66	31,0	147	69,0	0,587
Kullanyor	30	28,0	77	72,0	
Antibiyotikler soğuk algınlığı, grip gibi viral hastalıkları tedavi eder mi?					
Hayır	23	38,3	37	61,7	0,118
Evet ve fikrim yok	73	28,1	187	71,9	

Antibiyotiklerin ateş düşürücü özelliği var mıdır?					
Hayır	39	32,8	80	67,2	0,405
Evet ve fikrim yok	57	28,4	144	71,6	
Antibiyotiklerin burun akıntısı ve öksürüğü hafifletme özelliği var mıdır?					
Hayır	38	33,6	75	66,4	0,295
Evet ve fikrim yok	58	28,0	149	72,0	
Antibiyotikler önerilen süreden kısa veya uzun kullanıldığından antibiyotik direnci oluşur mu?					
Evet	87	36,7	150	63,3	<0,001
Hayır ve fikrim yok	9	10,8	74	89,2	
Gereksiz antibiyotik kullanımı durumunda antibiyotik direnci oluşur mu?					
Evet	58	38,9	91	61,1	0,001
Hayır ve fikrim yok	38	22,2	133	77,8	
İlaç fiyatı arttıkça ilaçın etkinliği de artar mı?					
Hayır	67	40,1	100	59,9	<0,001
Evet ve fikrim yok	29	19,0	124	81,0	
Akılçılık kullanımı farkındalığı					
Var	48	80,0	12	20,0	<0,001
Yok	48	18,5	212	81,5	

Pearson Ki-Kare Testi, [†]Fisher'in Kesin Ki-Kare Testi

Tablo 4'te, katılımcıların AİK durumu ile sosyodemografik özellikler arasında yapılan çok değişkenli lojistik regresyon analizinde modelin Nagelkerke'ye göre %19,4'ü açıklanmıştır (Enter metodu) ($p<0,001$). Geniş veya parçalanmış aile yapısına sahip olanlara göre, çekirdek aile yapısına

sahip olanların ilaçları akılçılık kullanma olasılığı 2,363 kat (OR, %95 GA: 1,110-5,028); aylık gelir düzeyi 1400 TL altında olanlara göre gelir düzeyi 1400-2800 TL arasında olanların ilaçları akılçılık kullanma olasılığı 4,751 kat (OR, %95 GA: 1,791-12,605) fazladır.

Tablo 4. Katılımcıların AİK durumu ile sosyo-demografik özellikleri arasında yapılan Lojistik Regresyon Analizi

	B	S.E.	Wald	d f	Sig.	Exp (B)	95% C.I.for EXP(B) Lower	Upper
Eğitim durumu								
İlkokul ve altı (Ref.)								
Ortaokul ve lise	0,324	0,519	0,391	1	0,532	1,383	0,500	3,821
Üniversite ve üstü	0,170	0,384	0,197	1	0,657	1,186	0,559	2,515
En uzun süre yaşanan yer								
İlçe, kasaba/ köy (Ref.)								
İl merkezi	-0,115	0,559	0,042	1	0,837	0,891	0,298	2,667
Aile tipi								
Geniş veya parçalanmış (Ref.)								
Cekirdek	0,860	0,385	4,981	1	0,026	2,363	1,110	5,028
Meslek								
Memur değil (Ref.)								
Memur	-0,376	0,551	0,466	1	0,495	0,686	0,233	2,022
Çalışma durumu								
Çalışmamak (Ref.)								
Çalışıyor	0,811	0,475	2,920	1	0,088	2,251	0,888	5,710
Aylık gelir düzeyi								
< 1400 TL (Ref.)								
1400-2800 TL	1,558	0,498	9,799	1	0,002	4,751	1,791	12,605
≥2800 TL	0,450	0,420	1,150	1	0,284	1,569	0,689	3,573

Ref.:Referans

Tablo 5'de, katılımcıların AİK durumu ile bazı AİK uygulamaları ve bilgi düzeyleri arasında yapılan çok değişkenli lojistik regresyon analizinde modelin Nagelkerke'ye göre %37,8'i açıklanmıştır (Enter metodu) ($p<0,001$). Araştırma grubunda ilaç fiyatı arttıkça, ilaçın etkinliğinin artmadığı bilgisine

sahip olanların bilgisi olmayanlara göre ilaçları akılçılık kullanma olasılığı 3,582 kat (OR, %95 GA:1,544-8,310) ve ilaçların akılçılık kullanımı ile ilgili farkındalığı olanların olmayanlara göre ilaçları akılçılık kullanma olasılığı 14,003 kat (OR, %95 GA:6,709-29,227) yüksek saptanmıştır (Tablo 5).

Tablo 5. Katılımcıların AİK durumu ile bazı AİK uygulamaları ve bilgi düzeyleri arasında yapılan Lojistik Regresyon Analizi

Değişkenler	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Evde ilaç bulundurma								
Evet (Ref.)								
Hayır	0,105	0,315	0,111	1	0,739	1,111	0,599	2,061
Antibiyotikler, önerilen süreden kısa veya uzun kullanırsa antibiyotik direnci oluşur mu?								
Hayır ve fikrim yok (Ref.)								
Evet	-0,144	0,391	0,136	1	0,712	0,866	0,403	1,862
Gereksiz antibiyotik kullanımı durumunda antibiyotik direnci oluşur mu?								
Hayır ve fikrim yok (Ref.)								
Evet	0,731	0,396	3,413	1	0,065	2,077	0,956	4,509
İlaç fiyatı arttıkça, ilacın etkinliği de artar mı?								
Evet ve fikrim yok (Ref.)								
Hayır	1,276	0,429	8,831	1	0,003	3,582	1,544	8,310
Akılçılık kullanımını farkındalığı								
Yok (Ref.)								
Var	2,639	0,375	49,418	1	<0,001	14,003	6,709	29,227

Ref.:Referans

TARTIŞMA

Araştırmada, her on katılımcıdan yedisinin ilaçları akılçılık kullanmadığı bulunmuştur. Literatürde akılçılık olmayan kullanım sıklıklarının %35,8-%76 arasında değiştiği bildirilmiş⁷⁻⁹, temel sorunlar arasında reçetesiz ilaç kullanımı, ilaçların yanlış kullanılması, gereksiz antibiyotik kullanımı, gereksiz olarak pahalı ilaç kullanımı gösterilmiştir.^{7,11} Literatür ile uyumlu olan bu bulgumuzda, akılçılık olmayan kullanım nedenlerinin benzer olduğu düşünülmüştür.

Önceki yürütülen çalışmalarında, ileri yaş, düşük eğitim, geniş aile yapısı, düşük gelir gibi sosyodemografik özelliklere sahip bireylerin AİK oranları daha düşük bildirilmiştir.^{9-11,14,18,20,21} Bu araştırmada, yaş ile AİK sıklığı arasında bir farklılık bulunamamış, sonucumuzu destekleyen çalışma¹⁵ gözleme de bu durum örneğimizin genç olması ile ilişkilendirilmiştir. Çünkü ileri yaşlarda artan kronik hastalıklar nedeniyle polifarmasi, yetersiz kullanım ve hatalı kullanım oranlarının yüksek olduğu gösterilmiştir.^{9,20} Yürüttülen çalışmalar ile uyumlu bulunan sonuçlarımıza göre; yüksek eğitim düzeyine sahip olanların ilaçların akılçılık kullanma eğiliminin yüksek olduğu^{7,14}, geniş aile yapısına sahip bireylerde deneyimlerin paylaşılmasının olumlu sonuçları olsa da sosyokültürel faktörlerin ve yanlış uygulamaların geniş aile yapısına sahip ailelerde daha fazla gözlenebileceği^{11,13}, yüksek gelir düzeyine sahip bireylerin akılçılık ilaç kullanımı bilgi düzeyi ve tutumlarının ve buna yönelik izlenen davranışların daha fazla akılçılık olduğu bildirilmiştir.¹⁰

Annelerin onda dokuzu kendisi hastalandığında, üchte ikisi çocukları

hastalandığında reçetesiz herhangi bir ilaç kullanmaktadır. Önceki çalışmalarda yetişkinlerde reçetesiz ilaç kullanım siklığı %12,5- %76,4 arasında bulunmuştur.^{7,13,22} Yürüttülen çalışmalarda reçetesiz kullanılan ilaçlar arasında çoğunlukla ağrı kesici kullanıldığı rapor edilmiştir.^{8,23} Ebeveynlerin çocuklara yönelik reçetesiz ilaç kullanım sikliğinin ise %8,0-%65,0 arasında değiştiği bildirilmiştir.^{11,24,25} Ebeveynlerin çocuklarına hatalı ilaç kullandığı durumlar en fazla çocuğun ateşlendiği ve ishal olduğu zamanlarda ortaya çıktıgı gözlenmiştir.¹² Literatüre paralel bulunan ve yüksek prevalansa sahip olan sonucumuzun eczanelere tezgah üstü ilaç satışlarının serbest olması ve evde depolama alışkanlıklar gibi yanlış uygulama alışkanlıklarının yüksek olması ile ilişkilendirilmiştir. Ek olarak, annelerin çocuklarına yönelik uygulamalarında, kendilerini yönelik akılçılık ilaç kullanımıyla ilgili alışkanlıklarının yansımalarının olabileceği düşünülmüştür.

Reçetesiz ilaç kullanımının, semptomları gizleme, hastalığın tanılamasını geciktirme gibi birçok sakıncaları da bulunmakla birlikte, aşırı derecede tüketilmesi ilaca bağlı istenmeyen etkileri de beraberinde getirmektedir.²⁶ Bunlardan en fazla karşılaşılan sorumlardan biri olan antibiyotik direnci, dünyada en önemli (?)sağlık sorunları arasında yer almaktır, hekim önerisi olmadan reçetesiz antibiyotik kullanımı nedeniyle de hızla artmaktadır.^{12,22} Araştırmamızda annelerin beşte ikisi kendisi hastalandığında, onda birinden azı çocukları hastalandığında reçetesiz antibiyotik kullanmaktadır. Önceki çalışmalarda, reçetesiz antibiyotik kullanım siklığı %8,0 - %35,1 arasında bulunmuştur.^{12,13} Özellikle reçetesiz antibiyotik kullanım durumunun yetersiz bilgi nedeniyle ortaya çıktıgı, farkındalığı olan annelerin antibiyotik

kullanma oranlarının daha düşük olduğu bildirilmiştir.¹⁷ Hekimlerin yanlış bilgi ve tutumları ile ilişkilendirilen reçetesiz antibiyotik kullanımı,²⁷ eczacıların yanlış yönlendirmesi ile daha ciddi boyuta ulaştığı saptanmıştır.²⁸ Ankara'da, yetişkinler ile yürütülen bir araştırmada %34,2'si son bir ay içerisinde antibiyotik kullanmış, bunların %14,2'si doktor önerisi olmadan kullanırken, %13,0'ı kendisi doktora reçete etmesini istemiştir.²⁹ Anneler, çocuğuna daha sıklıkla soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi viral hastalıklarda reçetesiz antibiyotik kullandığı saptanmıştır.^{11,21,22,29} Literatür ile benzer olan sonuçlarımız, yüksek oranda gözlenen reçetesiz antibiyotik kullanımının ebeveynlerin reçetesiz ilaç kullanım alışkanlıklarından kaynaklandığı ve bu durumun çocuklarına yönelik uygulamalarda benzer hataları yapmaları ile açıklanmıştır. Ayrıca Türkiye'de, 2016 yılından itibaren antibiyotiklerin reçetesiz satışı yasaklanmıştır.⁶ Veri toplanan tarihlerde yasak olmamasına rağmen sonucumuzun yüksek prevalanslara sahip çalışmalarдан görece düşük bulunması, farkındalık çalışmalarının kısmen etkili olduğunu düşündürmüştür. Ancak araştırmada, katılımcıların antibiyotik kullanımına yönelik bilgi düzeyleri incelendiğinde doğru bilgiye sahip annelerin oranları %18,8-%52,2 arasında bulunmuştur. Ankara'da yürütülen bir araştırmada, yetişkinlerin dörtte birinin antibiyotiklerin ateş düşürücü özelliğini olmadığını bildiği, yaklaşık yarısının viral enfeksiyonlarda antibiyotik alınmayıacağini bildiği, ancak üçte birinin grip soğuk algınlığı gibi durumlarda doğrudan eczaneeden antibiyotik aldığı belirlemiştir.²⁹ Çin'de yürütülen bir araştırmada, bilgi düzeyi yeterli olanların antibiyotikleri akılçılık kullanımının tutumlarına yansığı, eğitim kampanyalarına katılanların daha iyi tutumlar sergilediği bulunmuştur.²² Literatürde yürütülmüş diğer çalışmalar da, doğru bilgiye sahip kişilerin benzer oranlarda olduğu belirlenmiştir.^{21,30} Sonucumuzun, bilgi düzeyleri genel olarak düşük belirlenen çalışmalar ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Bulgumuzda, katılımcıların yaklaşık beşte ikisinin evde ilaç bulundurduğu ve üçte birinin herhangi birinin tavsiyesiyle ilaç kullandığı saptanmıştır. Ürdün'de, yetişkinlerin yaklaşık yarısının tavsiye ile antibiyotik kullandığı³⁰, Amerika'da ise tavsiye ile ilaç kullanma nedeninin olumsuz akran iletişiminden kaynaklandığı bildirilmiştir.³¹ Ülkemizde tavsiye ile ilaç kullanma, ilaç tavsiye etme, hekimden ilaç yazmasını isteme, evlerinde ilaç depolama davranışlarının sıkılıkla gözlendiği belirlenmiştir.^{8,11} İlaçların, hekimin belirttiği veya prospektüste belirtilen doz ve biçimden farklı kullanılması, öngörülen süreden önce kesilmesi, olumsuz sonuçlara neden olabileceği gibi, evde kullanılmayan ilaçların

sayısını da artırmaktadır.²⁶ Sonucumuzun da literatür ile parallellik gösterdiği bulunmuştur.

SONUÇ

Beş yaş altı çocuğu olan yaklaşık üç anneden biri ilaçları akılçılık kullanmaktadır. Annelerin kendilerine yönelik reçetesiz ilaç kullanımı ve reçetesiz antibiyotik kullanımına çocuklarına kıyasla yüksek düzeydedir. Her beş katılımcıdan yaklaşık ikisi evde ilaç bulundurmaktır, üçte biri tavsiye ile ilaç kullanmaktadır. Antibiyotik kullanımına yönelik doğru bilgiye sahip annelerin oranları %18,8-%52,2 arasında değişmektedir. Geniş veya parçalanmış aile yapısına sahip olanlara göre, çekirdek ailede yaşayanların, asgari ücretin altında (<1400 TL) geliri olanlara göre 1400-2800 TL geliri olanların, ilaç fiyatı arttıkça ilacın etkinliğinin artmadığını bileyenlerin ve ilaçların akılçılık kullanımını ile ilgili farkındalığı olanların ilaçları akılçılık kullanım olasılığı yüksek saptanmıştır.

Beş yaş altı çocuğu olan annelerin, birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurusu bir fırsat olarak görülmeli ve görüşme süreçleri iyi değerlendirilmelidir. Hasta yakını sorumluluğu da olan beş yaş altı çocuğu olan annelerin, akılçılık ilaç kullanımına yönelik farkındalık ve eğitim çalışmaları planlanmalı ve katılımları sağlanmalıdır. Derinlemesine görüşmeler ile geniş ailede yaşayan, düşük gelire sahip, yetersiz bilgi ve farkındalığı olan anneleri akılçılık olmayan ilaç kullanımına yönelik durumlar araştırılmalı ve reçetesiz ilaç ve reçetesiz antibiyotik kullanımına yönelik surveyans çalışmaları artırılmalıdır. Sahaya yönelik uygulamalarda, AİK konusunda tüm tarafların sorumluluklarının yerine getirilmesi için toplum farkındalığı artırılmalıdır.

Teşekkür

Bu makale, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde hazırlanan yüksek lisans tezine dayanmaktadır. 13-17 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde sözlü olarak sunulmuş ve tam metni yayınlanmıştır.

Çıkar çatışması: Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.

Maddi destek: Araştırmacılar kendi finansman kaynaklarını kullanmıştır.

KAYNAKLAR

1. World Health Organization. The Pursuit of Responsible Use of Medicines: Sharing and Learning from Country Experiences. 20 Avenue Appia, 1211, Geneva 27, Switzerland, 2012, page 2.

2. Katzung GB, Masters SB, Trevor AJ. Basic and Clinical Pharmacology. Rational Prescribing and Prescription Writing. 11. Edition, Mac GrawHill Medical, 2009.
3. World Health Organization. Antimicrobial Resistance: A Threat to Global Health Security. Rational use of medicines by prescribers and patients. Fifty-Eighth World Health Assembly, Apr 2005; A58/14, page 2-6.
4. Akkurt B. Araştırma Görevlilerinin (Branş) Akılçılı İlacı Kullanımı Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2016. Sayfa: 9.
5. World Health Organization. Antibiotic Resistance, Key facts. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance> Son erişim tarihi: 23.05.2020.
6. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Türkiye'de Antimikrobiyal Direnç: Ekonomik Değerlendirme ve Öneriler. Ankara, Sayfa: 10-11 Son erişim tarihi: 23.05.2020. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1504774735-1.Turkiye_de_Antimikrobiyal_Direnc_Ekonominik_Degerlendirme_ve_Oneriler.pdf
7. Hatipoğlu S, Özyurt BC. Manisa İlindeki Bazı Aile Sağlığı Merkezlerinde Akılçılı İlaci Kullanımı, TAF Prev Med Bull, 2016;15(4): 1-8. DOI: 10.5455/pmb.1-1441352977.
8. Akıcı A, Mollahaliloglu S, Dönertas B, Özgürçü Ş, Alkan A, Filiz Başaran N. Patients' attitudes and knowledge about drug use: a survey in Turkish family healthcare centres and state hospitals. Turk J Med Sci. 2017 Nov 13;47(5):1472-1481. doi: 10.3906/sag-1608-29.
9. Wauters M, Elseviers M, Vaes B, Degryse J, Dalleur O, Vander Stichele R, Christiaens T, Azermair M. Too many, too few, or too unsafe? Impact of inappropriate prescribing on mortality, and hospitalization in a cohort of community-dwelling oldest old. Br J Clin Pharmacol. 2016 Nov;82(5):1382-1392. doi: 10.1111/bcpt.13055.
10. Bian C, Xu S, Wang H, Li N, Wu J, Zhao Y, Li P, Lu H. A Study on the Application of the Information-Motivation-Behavioral Skills (IMB) Model on Rational Drug Use Behavior among Second-Level Hospital Outpatients in Anhui, China. PLoS One. 2015 Aug 14;10(8):e0135782. doi: 10.1371/journal.pone.0135782.
11. Ekenler Ş, Koçoğlu D. Bireylerin Akılçılı İlaci Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları. HÜ Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016; 3(3): 44-55.
12. Li R, Xiao F, Zheng X, Yang H, Wang L, Yin D, Yin T, Xin Q, Chen B. Antibiotic misuse among children with diarrhea in China: results from a national survey. PeerJ, 2016;4, e2668.
13. Koç Türkoğlu F. Pediyatri Kliniğine Başvuran Annelerin Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2008. Sayfa 1-109
14. Barutçu IA, Tengilimoğlu D, Naldöken Ü. Vatandaşların Akılçılı İlaci Kullanımı, Bilgi ve Tutum Değerlendirmesi: Ankara İli Metropol İlçeler Örneği. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Dergisi, 2017;19(3): 1062-1078.
15. De La Rosa M, Huang H, Brook JS, Sanchez M, Rojas P, Kanamori M, Cano MA, Martinez M. Sociocultural determinants of substance misuse among adult Latinas of Caribbean and South and Central American descent: A longitudinal study of a community-based sample. J Ethn Subst Abuse. Jul-Sep 2018;17(3):303-323. doi: 10.1080/15332640.2016.1201716.
16. Altındış S. (2017). Akılçılı İlaci Kullanımına Sistematisk Bir Bakış. Journal of BSHR 2017;1(2):34-38
17. Kenesarı CK, Özçakar N. Annelerin çocuklarında antibiyotik kullanımına ilişkin yaklaşımları: Kısa bilgilendirme ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2016;20 (1): 16-22. doi: 10.15511/tahd.15.21614
18. Al-Shawi MM, Darwish MA, Wahab MMA, Al-Shamlan NA. Misconceptions of parents about antibiotic use in upper respiratory tract infections: A survey in primary schools of the Eastern Province, KSA. J Family Community Med. Jan-Apr 2018;25(1):5-12. doi: 10.4103/jfcm.JFCM_46_17.
19. Yılmaz F, Arıkan D, Baklacı Ö, Bilmez A, Bülbül D. 0-2 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Oral İlaci Kullanım Davranışlarının İncelenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 2013;16(2):82-88.
20. Hilmer SN, Gnjidic D. Prescribing for Frail Older People. Aust Prescr. 2017 Oct;40(5):174-178. doi: 10.18773/austprescr.2017.055.
21. Aleem MA, Rahman MM, Ishfaq M, Mehmood, K, Ahmed SS. Determinants of Antibiotics Misuse by the Parents in Children: A Survey From Northern Region of Saudi Arabia. Bangladesh J Child Health 2016; 40(2): 64-71.
22. Cheng J, Coope C, Chai J, Oliver I, Kessel A, Wang D, Sun Y. Knowledge and behaviors in relation to antibiotic use among rural residents in Anhui, China. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Jun;27(6):652-659. doi: 10.1002/pds.4429.

23. Han B, Compton WM, Blanco C, Crane E, Lee J, Jones CM. Prescription opioid use, misuse, and use disorders in US adults: 2015 National Survey on Drug Use and Health. *Ann Intern Med.* 2017 Sep 5;167(5):293-301. doi: 10.7326/M17-0865.
24. Oliveira EA, Bertoldi AD, Domingues MR, Santos IS, Barros AJ. Medicine use from birth to age two years: the 2004 Pelotas (Brazil) Birth Cohort study. *Rev Saude Publica.* 2010 Aug;44(4):591-600.
25. Suluhan D, Taşal C, Yıldız D, Eren Fidancı B, Konukbay D, Gök F, Sürer İ. 0-6 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Ateş Düşürücü İlaç Kullanımına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. *F.N. Hem. Derg.* 2016; 24(2): 90-96. DOI: 10.17672/fnhd.34351
26. Güneş ÜY, Gürlek Ö, Sönmez M. Factors contributing to medication errors in Turkey: nurses' perspectives. *J Nurs Manag.* 2014 Apr;22(3):295-303. doi: 10.1111/jonm.12216.
27. Baig MT, Sial AA, Huma A, Ahmed M, Shahid U, Syed N. Irrational antibiotic prescribing practice among children in critical care of tertiary hospitals. *Pak J Pharm Sci.* 2017 Jul;30(4(Suppl.)):1483-1489.
28. Yakimova Y. Pharmacists' knowledge of the safety of antibiotics for systemic use. *Int J Risk Saf Med.* 2015;27 Suppl 1:S11-2. doi: 10.3233/JRS-150670.
29. Özkan S, Tunca MZ, Baran Aksakal FN, Özdemirkan T, Aycan S. Ankara'da Bazı Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranlarda Antibiyotik Kullanımı Ve İlişkili Etmenler. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, Bursa; 2012;338-341.
30. Shehadeh M, Suaifan G, Darwish RM, Wazaify M, Zaru L, Alja'fari S. Knowledge, attitudes and behavior regarding antibiotics use and misuse among adults in the community of Jordan: A pilot study. *Saudi Pharm J.* 2012 Apr;20(2):125-33. doi: 10.1016/j.jps.2011.11.005.
31. McCabe SE, Teter CJ, Boyd CJ, Wilens TE, Schepis TS. Sources of Prescription Medication Misuse Among Young Adults in the United States: The Role of Educational Status. *J Clin Psychiatry.* 2018 Mar/Apr;79(2). pii: 17m11958. doi: 10.4088/JCP.17m11958.